

Samlet statistik 28 år Hjemmefødselsordning Sjælland 1991-2018	20 år		8 år		28 år		
	1991-2010		2011-2018		1991-2018		
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	
Indskrevne			2932	100,0			
Førstegangsfødende			732	25,0			
Flergangsfødende			2200	75,0			
Omvisiterede			552	18,8			
Førstegangsfødende			204	27,9			
Flergangsfødende			348	15,8			
Start fødsel hjemme	1663	100,0	2380	100,0	4043	100,0	
Førstegangsfødende	368	22,13	528	22,2	896	22,2	
Flergangsfødende	1295	77,87	1852	77,8	3147	77,8	
Overflyttet til sygehus før barnets fødsel	186	11,18	252	10,6	438	10,8	
Førstegangsfødende	116	31,5	172	32,6	288	32,1	
ukompliceret fødsel efter overflytning*			80	15,2			
Flergangsfødende	70	5,4	80	4,3	150	4,8	
ukompliceret fødsel efter overflytning*			54	2,9			
Epidural			76	4,6			
S-drop	85	5,1	143	8,6	228	5,6	
Sugekop / tang	45	2,7	52	2,2	97	2,4	
Episiotomi (klip)	33	2,0	17	0,7	50	1,2	
Akut kejsersnit (alle fødende)	58	3,5	65	2,7	123	3,0	
Bristning gr. III/IV** (alle fødende)	18	1,1	5	0,2	23	0,6	
Afsluttet fødsel hjemme	1477	88,82	2128	89,4	3605	89,2	
Førstegangsfødende	252	68,48	356	67,4	608	67,9	
Flergangsfødende	1225	94,59	1772	95,7	2997	95,2	
Vandfødsler	900	54,12	1251	52,6	2151	53,2	
RKKP-indikatorer alle fødende***	1663	100,0	2380	100,0	4043	100,0	Standard
3) Bristning gr. III/IV, (1. gangs-)			7	1,3			≤ 6,0
5) Blødning ≥ 1000 ml			57	2,4			≤ 4,0
7b) Svær hypoxi (Apgar < 7/5)			10	0,4			≤ 1,0
8A) Ukomplic. forløb (1. gangs-)			400	75,8			≥ 60
8B) Akut sectio (1. gangs-) til termin (37-42), barn i HS			47	8,9			ingen
Overflyttet efter barnets fødsel	62	3,7	78	3,3	140	3,5	
Førstegangsfødende	35	9,5	38	7,2	73	8,1	
Flergangsfødende	27	2,1	40	2,2	67	2,1	
Fastsiddende moderkage			25	1,1			
Blødning			16	0,7			
Syning af større bristning			16	0,7			
Svangerskabsforgiftning (præeklampsi)			1	0,0			
Påvirket barn			20	0,8			
Andel af fødende overflyttet før og efter fødslen	248	14,9	330	13,9	578	14,3	
Førstegangsfødende	151	41,0	210	39,8	361	40,3	
Flergangsfødende	97	7,5	120	6,5	217	6,9	

* ukompliceret fødsel efter overflytning: epidural og S-drop gør ikke fødslen kompliceret (jf. RKKP)

** bristning gr. III/IV: involverer endetarmsmusklen

*****RKKP-indikatorer: registrering start i 2011**

Indikator 1: Andelen af fødepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time fra de er bestilt (sygehus)

Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen (udgået)

Indikator 3: Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV)

Indikator 4A: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i.h.t. det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 1 \leq 15 min (sygehus)

Indikator 4B: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i.h.t. det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2 \leq 30 min (sygehus)

Indikator 5: Andelen af kvinder med målt blodtab \geq 1000 ml indenfor 2 timer efter fødslen

Indikator 6: Andelen af fødsler, hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn (udgået)

Indikator 7b: Andelen af børn med Apgar $<$ 7 efter 5 min.

Indikator 8A: Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende

Andelen af ukomplicerede fødsler (ikke kejsersnit, ikke cup eller tang, ikke episiotomi, ikke grad III eller IV bristninger, ikke blødning \geq 1000 ml.) med fødsel af rask barn, der får Apgar \geq 9/5

Indikator 8B: Andelen af akut kejsersnit hos førstegangsfødende til tiden med barn i hovedstilling

Indikator 9: Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi (sygehus)

https://www.sundhed.dk/content/cms/66/4666_dansk-kvalitetsdatabase-for-fdsler-opdateret-marts-2018-aarsrapport-dkf.pdf