

Samlet statistik 26 år HOS 1991-2016	20 år		6 år		26 år	
	1991-2010		2011-2016		1991-2016	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Indskrevne			1871	100,0		
Førstegangsfødende			451	24,1		
Flergangsfødende			1420	75,9		
Omvisiterede			350	18,7		
Førstegangsfødende			120	26,6		
Flergangsfødende			230	16,2		
Start fødsel hjemme	1663	100,0	1521	100,0	3184	100,0
Førstegangsfødende	368	22,1	331	21,8	699	22,0
Flergangsfødende	1295	77,9	1190	78,2	2485	78,0
Overflyttet til sygehus før barnets fødsel	186	11,18	152	10,0	338	10,6
Førstegangsfødende	116	31,5	106	32,0	222	31,8
ukompliceret fødsel efter overflytning*			43	13,0		
Flergangsfødende	70	5,4	46	3,9	116	4,7
ukompliceret fødsel efter overflytning*			32	2,7		
Epidural			51	3,1		
S-drop	85	5,1	95	5,7	180	5,7
Sugekop / tang	45	2,7	33	2,2	78	2,4
Episiotomi (klip)	33	2,0	11	0,7	44	1,4
Akut kejsersnit (alle fødende)	58	3,5	47	3,1	105	3,3
Bristning gr. III/IV** (alle fødende)	18	1,1	11	0,7	29	0,9
Afsluttet fødsel hjemme	1477	88,8	1369	90,0	2846	89,4
Førstegangsfødende	252	68,5	225	68,0	477	68,2
Flergangsfødende	1225	94,6	1144	96,1	2369	95,3
Vandfødsler	900	54,1	824	54,2	1724	54,1
RKKP-indikatorer alle fødende***	1663	100,0	1521	100,0	3184	100,0
1) Epidural (anlæggelse < 1 time efter bestill.)			50	98,0		

	2016	
Standard	RS %	DK %
≥ 95,0	88,9	88,1

2) Jdm. kontinuerligt tilstede i aktive fase			1482	97,4		
3) Bristning gr. III/IV, (1. gangs-)			9	2,7		
4A) Akut sectio, grad 1 i.h.t. tidsinterval (< 15 min)			9	100,0		
4B) Akut sectio, grad 2 i.h.t. tidsinterval (< 30 min)			38	100,0		
5) Blødning \geq 1000 ml			30	2,0		
6) Hud mod hud kontakt			1466	96,4		
7) Svær hypoxi (pH < 7,0 / Apgar < 7/5)			4	0,3		
8A) Ukomplic. forløb (1. gangs-)			250	75,5		
8B) Akut sectio (1. gangs-) til termin (37-42), barn i HS			34	10,3		
9) Akut sectio, andel grad 2 i regional anæstesi			38	100,0		
Overflyttet efter barnets fødsel	62	3,7	48	3,2	110	3,5
Førstegangsfødende	35	9,5	25	7,6	60	8,6
Flergangsfødende	27	2,1	23	1,9	50	2,0
Fastsiddende moderkage			12	0,8		
Blødning			11	0,7		
Syning af større bristning			11	0,7		
Svangrskabsforgiftning (præeklampsi)			1	0,1		
Påvirket barn			13	0,9		
Andel af fødende overflyttet før og efter fødslen	248	14,9	200	13,1	448	14,1
Førstegangsfødende	151	41,0	131	39,6	282	40,3
Flergangsfødende	97	7,5	69	5,8	166	6,7

$\geq 90,0$	94,0	93,7
$\leq 6,0$	3,5	4,1
$\geq 90,0$	78,7	83,1
$\geq 95,0$	82,3	83,0
$\leq 4,0$	6,9	6,9
$\geq 90,0$	91,2	91,8
$\leq 1,0$	0,7	0,6
≥ 60	60,8	63,9
ingen	16,0	12,6
≥ 90	72,7	89,4

tal med sort er fra 2015,
da disse indikatorer er
udgået i 2016-opgørelse

* ukompliceret fødsel efter overflytning: epidural og S-drop gør ikke fødslen kompliceret (jf. RKKP)

** bristning gr. III/IV: involverer endetarmsmusklen

***RKKP-indikatorer: registrering start i 2011

Indikator 1: Andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time fra de er bestilt

Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen

Indikator 3: Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV)

Indikator 4A: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 1 \leq 15 min

Indikator 4B: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2 \leq 30 min

Indikator 5: Andelen af kvinder med målt blodtab \geq 1000 ml indenfor 2 timer efter fødslen

Indikator 6: Andelen af fødsler, hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn

Indikator 7: Andelen af børn, der neonatalt har svær hypoxi (pH $<$ 7,0, eller hvis ej pH, da Apgar $<$ 7/5)

Indikator 8A: Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende

Andelen af ukomplicerede fødsler (ikke kejsersnit, ikke cup eller tang, ikke episiotomi, ikke grad III eller IV
bristninger, ikke blødning \geq 1000 ml.) med fødsel af rask barn, der får Apgar \geq 9/5.

Indikator 8B: Andelen af akut kejsersnit hos førstegangsfødende til tiden med barn i hovedstilling

Indikator 9: Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi

https://www.sundhed.dk/content/cms/66/4666_aarsrapport_foedsler.pdf