

Samlet statistik 27 år Statistik HOS 1991-2017	20 år		7 år		27 år	
	1991-2010		2011-2017		1991-2017	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>Indskrevne</b>			<b>2386</b>	<b>100,0</b>		
Førstegangsfødende			588	24,6		
Flergangsfødende			1798	75,4		
<b>Omvisiterede</b>			<b>445</b>	<b>18,7</b>		
Førstegangsfødende			163	27,7		
Flergangsfødende			282	15,7		
<b>Start fødsel hjemme</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>	<b>1941</b>	<b>100,0</b>	<b>3604</b>	<b>100,0</b>
Førstegangsfødende	368	22,13	425	21,9	793	22,0
Flergangsfødende	1295	77,87	1516	78,1	2811	78,0
<b>Overflyttet til sygehus før barnets fødsel</b>	<b>186</b>	<b>11,18</b>	<b>204</b>	<b>10,5</b>	<b>390</b>	<b>10,8</b>
Førstegangsfødende	116	31,5	139	32,7	255	32,2
ukompliceret fødsel efter overflytning*			60	14,1		
Flergangsfødende	70	5,4	65	4,3	135	4,8
ukompliceret fødsel efter overflytning*			46	3,0		
Epidural			68	4,1		
S-drop	85	5,1	121	7,3	206	5,7
Sugekop / tang	45	2,7	45	2,3	90	2,5
Episiotomi (klip)	33	2,0	14	0,7	47	1,3
Akut kejsersnit (alle fødende)	58	3,5	56	2,9	114	3,2
Bristning gr. III/IV** (alle fødende)	18	1,1	3	0,2	21	0,6
<b>Afsluttet fødsel hjemme</b>	<b>1477</b>	<b>88,82</b>	<b>1737</b>	<b>89,5</b>	<b>3214</b>	<b>89,2</b>
Førstegangsfødende	252	68,48	286	67,3	538	67,8
Flergangsfødende	1225	94,59	1451	95,7	2676	95,2
Vandfødsler	900	54,12	1034	53,3	1934	53,7
<b>RKKP-indikatorer alle fødende***</b>	<b>1663</b>	<b>100,0</b>	<b>1941</b>	<b>100,0</b>	<b>3604</b>	<b>100,0</b>
3) Bristning gr. III/IV, (1. gangs-)			5	1,2		
5) Blødning $\geq$ 1000 ml			40	2,1		
7) Svær hypoxi (pH < 7,0 / Apgar < 7/5)			5	0,3		
8A) Ukomplic. forløb (1. gangs-)			323	76,0		
8B) Akut sectio (1. gangs-) til termin (37-42), barn i HS			41	9,6		
<b>Overflyttet efter barnets fødsel</b>	<b>62</b>	<b>3,7</b>	<b>61</b>	<b>3,1</b>	<b>123</b>	<b>3,4</b>
Førstegangsfødende	35	9,5	31	7,3	66	8,3
Flergangsfødende	27	2,1	30	2,0	57	2,0
Fastsiddende moderkage			18	0,9		
Blødning			13	0,7		
Syning af større bristning			14	0,7		
Svangerskabsforgiftning (præeklampsi)			1	0,1		
Påvirket barn			15	0,8		
<b>Andel af fødende overflyttet før og efter fødslen</b>	<b>248</b>	<b>14,9</b>	<b>265</b>	<b>13,7</b>	<b>513</b>	<b>14,2</b>
Førstegangsfødende	151	41,0	170	40,0	321	40,5
Flergangsfødende	97	7,5	95	6,3	192	6,8

Standard	2016	
	RS %	DK %
$\leq$ 6,0	3,5	4,1
$\leq$ 4,0	6,9	6,9
$\leq$ 1,0	0,7	0,6
$\geq$ 60	60,8	63,9
ingen	16,0	12,6

\* ukompliceret fødsel efter overflytning: epidural og S-drop gør ikke fødslen kompliceret (jf. RKKP)

\*\* bristning gr. III/IV: involverer endetarmsmusklen

**\*\*\*RKKP-indikatorer: registrering start i 2011**

Indikator 1: Andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time fra de er bestilt

ej relevant for HOS  
udgået sept. 2016

Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen

Indikator 3: Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV)

Indikator 4A: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i.h.t. det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 1  $\leq$  15 min

ej relevant for HOS

Indikator 4B: Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i.h.t. det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2  $\leq$  30 min

ej relevant for HOS

Indikator 5: Andelen af kvinder med målt blodtab  $\geq$  1000 ml indenfor 2 timer efter fødslen

Indikator 6: Andelen af fødsler, hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn

udgået sept. 2016

Indikator 7: Andelen af børn, der neonatalt har svær hypoxi (pH < 7,0, eller hvis ej pH, da Apgar < 7/5)

Indikator 8A: Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende

Andelen af ukomplicerede fødsler (ikke kejsersnit, ikke cup eller tang, ikke episiotomi, ikke grad III eller IV bristninger, ikke blødning  $\geq$  1000 ml.) med fødsel af rask barn, der får Apgar  $\geq$  9/5.

Indikator 8B: Andelen af akut kejsersnit hos førstegangsfødende til tiden med barn i hovedstilling

Indikator 9: Andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi

ej relevant for HOS

[https://www.sundhed.dk/content/cms/66/4666\\_aarsrapport\\_fodsler.pdf](https://www.sundhed.dk/content/cms/66/4666_aarsrapport_fodsler.pdf)